

Vissa mediciner kan ge biverkningar i form av hörselnedsättning och tinnitus. När det gäller en del antidepressiva mediciner och starka antibiotika finns det risk för tinnitus. Den som har tinnitus bör även undvika en del vanliga smärtstillande medel eftersom de kan göra besvären värre.

Mediciner kan ge tinnitus



FOTO: WILLI MATHEIS/SCANPIX

ANTIBIOTIKA, cytostatika (cellgifter) och antidepressiva läkemedel är exempel på grupper av mediciner där det förekommer hörselrelaterade biverkningar. Vissa sorters antidepressiva kan till exempel orsaka bestående tinnitus. Sådana biverkningar kan även uppstå om man använder vissa sorters blodtrycks-sänkande och vattendrivande mediciner. Receptfria medel mot smärta, feber och inflammation kan också orsaka eller förvärra tinnitus. Möjligheten att byta medicin ser naturligtvis olika ut beroende på vilken diagnos man har fått från början.

Diskutera med läkaren

– Om det är frågan om överlevnad, till exempel vid cancerbehandling eller allvarliga infektioner, så kanske det inte går att byta ut medicinen. Men man ska alltid diskutera saken med sin läkare, säger Konrad Konradsson, över-

läkare på audiologiavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ett allmänt tips är också att man alltid bör vara uppmärksam på förändringar i hörseln i samband med medicinering och genast ta upp sådana med sin läkare.

– Om man redan har tinnitus bör man påtala det hos läkaren, säger Konrad Konradsson.

Han avråder tinnituspatienter från att använda smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra (till exempel Treo och Magnecyl) eftersom de kan förvärra tinnitusen.

En del mediciner ger endast en tillfällig hörselnedsättning eller tinnitus och ibland är risken för sådana biverkningar liten. Ett enkelt sätt att kolla vad som gäller för en viss medicin är att gå in på webbplatsen www.fass.se. Där kan man också läsa om hur stor risken för biverkningar är.

TOVE LILIEQUIST

Exempel på mediciner som kan orsaka tinnitus

Antibiotika:	Bamyl	Mediciner som sänker blodtrycket:
Bactrim	Bamyl Koffein	Alfadil
Bactrim Forte	Clinoril	Renitec
Surlid	Confortid	Synerpril
Tarivid	Diklofenak (även hörselnedsättning)	Verapamil
Vancocin (även hörselnedsättning)	Ibumetin (även övergående hörselnedsättning)	Vattendrivande medel:
Antidepressiva:	Indomee	Furix (även övergående hörselnedsättning)
Cipramil	Ipren (även övergående hörselnedsättning)	Furosemid
Ludiomil	Koffazon	Impugan (även övergående hörselnedsättning)
Saroten	Magnecyl	Lasix
Seroxat	Magnecyl Koffein	Övriga mediciner:
Tryptizol	Naprosyn (även hörselnedsättning)	Kinin (bland annat mot malaria)
Zoloft	Naproxen (även hörselnedsättning)	Koffein
Cytostatika (cellgifter):	Pronaxen (även hörselnedsättning)	Lergigan Comp (lugnande, antidepressivt, mot allergi)
Cisplatin	Relifex	Salazopyrin (antiinflammatoriskt)
Paraplatin	Treo/Treo Comp	
Mot smärta, feber och inflammation:	Voltaren (även hörselnedsättning)	
Albyl Minor		
Alganex		
Alka-Seltzer		
Alpoxen (även hörselnedsättning)		
Aspirin		

Fotnot: Observera att risken varierar för de olika läkemedlen. Läs mer om medicinerna på www.fass.se eller fråga din läkare.



Stiftelsen Mo Gård

En resurs för personer med dövblindhet och döva personer med tilläggs-handikapp.

Genom Ditt bidrag stöder Du forskning och utveckling för dessa grupper.

Tacksam för Ditt bidrag på vårt kontrollgirokonto 901136-2.

Stiftelsen Mo Gård
Box 175, 612 24 Finspång
Tel: 0122-23600
www.mogard.se